



LA LEISHMANIOSE CANINE

ÉVOLUTION DE LA LEISHMANIOSE : LE SUD TOUCHÉ, LES VALLÉES DU RHÔNE ET DU SUD-OUEST À RISQUE




La dernière enquête vétérinaire du Pr Patrick Bourdeau montre que la zone endémique de leishmaniose canine couvrait au moins 29 départements en 2017 (26 en 2011*, 24 en 2004 et 18 en 1986). En 2017, le front de l'extension de la leishmaniose canine a progressé surtout vers le Nord dans le Rhône, la Dordogne et la Haute Loire.



EXPANSION DE LA ZONE ENDÉMIQUE

- 2017 (+9%)
- 2011 (+60%)
- 2004
- Communes limitrophes actuelles de la zone d'endémie.
- ★ Cas autochtones - chiens n'ayant pas séjourné en région endémique (ni en France ni à l'étranger)



MALADIE COMMUNE AU CHIEN ET À L'HOMME

Le chien réservoir de la maladie



VECTEUR : LE PHLÉBOTOME

EN FRANCE EN 2017 ENVIRON **10 000* CHIENS MALADES**

*Canine Generalized Leishmaniosis in France : distribution and dynamics : 4th national survey with veterinary clinics. P. BOURDEAU, C. ROUX, C. DOUINE, F. CARREZ, L. IMPARATO, M. HILARY. Unit DPM - Dept. Clin. Sci. - Veterinary School Nantes - ONIRIS - Univ. Nantes - France 2017

20 À 40 CAS de leishmaniose humaine
Source www.fregis.com (2016)

LES SYMPTÔMES

- Abattement, amaigrissement ;
- Augmentation de la taille des ganglions ;
- Perte de poils, pellicules ;
- Atteinte de la truffe, allongement anormal des griffes.

PROTÉGEZ VOTRE CHIEN

- **Vacciner** : réduit le risque de développer la maladie
- **Traiter** : avec un insecticide répulsif adapté et en continu
- **Limiter** : l'exposition au vecteur, en gardant le chien à l'intérieur du crépuscule à l'aube
- **Suivre** : médicalement tout chien porteur ou malade

Demandez conseil à votre vétérinaire

lasantedemonchien.com

MSD
Santé Animale