

Scalibor®

Pipa

Miguel

somos
família

Indicações terapêuticas: Eliminação das pulgas (*Ctenocephalides felis*) nos cães e prevenção de novas infestações durante 4 meses. Eliminação de carrapatos (*Ixodes ricinus*; *Rhipicephalus sanguineus*) e prevenção de novas infestações durante 6 meses. Prevenção da picada do flebotomo (*Phlebotomus perniciosus*) durante 12 meses. Efeito antilinfarar em mosquitos adultos (*Culex pipiens pipiens*) durante 6 meses. Devido ao efeito repelente da coleira contra flebotomos, a Scalibor® Protector Band pode ser utilizada como parte da estratégia de prevenção contra a leishmaniose. **Espécies alvo:** Caninos (cães). **Precauções especiais para utilização em animais:** Em caso de lesões cutâneas remover a coleira até os sintomas ficarem resolvidos. N.º e data da AIM: 388/01/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011 e 388/02/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011. Leia atentamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvidas ou persistência dos sintomas, consulte o Médico Veterinário. PT-SCA-210300003



12 MESES



Esqueça-se do flebotomo transmissor
da leishmaniose durante todo um ano

www.scalibor.pt

 **MSD**
Animal Health

Scalibor®

Rufus

Pedro

somos
família



12  MESES



Esqueça-se do flebótomo transmissor
da leishmaniose durante todo um ano

www.scalibor.pt

 **MSD**
Animal Health

Indicações terapêuticas: Eliminação das pulgas (*Ctenocephalides felis*) nos cães e prevenção de novas infestações durante 4 meses. Eliminação de carrapatos (*Ixodes ricinus*; *Rhipicephalus sanguineus*) e prevenção de novas infestações durante 6 meses. Prevenção da picada do flebótomo (*Phlebotomus perniciosus*) durante 12 meses. Efeito antialimentar em mosquitos adultos (*Culex pipiens pipiens*) durante 6 meses. Devido ao efeito repelente da coleira contra flebótomos, a Scalibor® Protector Band pode ser utilizada como parte da estratégia de prevenção contra a leishmaniose. **Espécies alvo:** Caninos (cães). **Precauções especiais para utilização em animais:** Em caso de lesões cutâneas remover a coleira até os sintomas ficarem resolvidos. N.º e data da AIM: 388/01/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011 e 388/02/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011. Leia atentamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvidas ou persistência dos sintomas, consulte o Médico Veterinário. PT-SCA-210300003