

Motivos para escolher Scalibor®?



Adaptado às atuais condições climáticas



12 meses de proteção contra o flebótomo transmissor da leishmaniose¹

94 a 98%



Elevado efeito repelente^{1,2}



Utilização em cachorros e cadelas gestantes

1. Alten B, Maia C, Afonso MO, Campino L, Jiménez M, González E, et al. (2016) Seasonal Dynamics of Phlebotomine Sand Fly Species Proven Vectors of Mediterranean Leishmaniasis Caused by Leishmania infantum. PLoS Negl Trop Dis 10(2):e0004458. doi:10.1371/journal.pntd.0004458.

2. Samara Paulin, Régis Frénaix, Emmanuel Thomas Email author and Paul M. Laboratory assessment of the anti-feeding effect for up to 12 months of a slow release deltamethrin collar (Scalibor®) against the sand fly Phlebotomus perniciosus in dogs. Parasites & Vectors 2018 11:529.

www.scalibor.pt

Indicações terapêuticas: Eliminação das pulgas (Ctenocephalides felis) nos cães e prevenção de novas infestações durante 6 meses. Eliminação de carraças (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) e prevenção de novas infestações durante 6 meses. Prevenção da picada do flebótomo (Phlebotomus perniciosus) durante 12 meses. Efeito antialimentar em mosquitos adultos (Culex pipiens pipiens) durante 6 meses. Devido ao efeito repelente da coleira contra flebótomos, a Scalibor® Protector Band pode ser utilizada como parte da estratégia de prevenção contra a leishmaniose. Espécies alvo: Caninos (cães). Precauções especiais para utilização em animais: Em caso de lesões cutâneas remover a coleira até os sintomas ficarem resolvidos. N.º e data da AIM: 388/01/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011 e 388/02/11NFVPT de 05 de Dezembro de 2011. Leia atentamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvidas ou persistência dos sintomas, consulte o Médico Veterinário.

PT SCA-20030006

MSD
Animal Health

Scalibor®

Pipa

Miguel

somos
família

Scalibor®



12 MESES

Esqueça-se do flebótomo transmissor da leishmaniose durante todo um ano


somos
família

A LEISHMANIOSE


É uma doença grave, produzida por um parasita que se transmite através de um “mosquito” chamado flebótomo.

Como se transmite?

A leishmaniose não se transmite diretamente de cão para cão, é necessária a existência de um flebótomo que pica um cão infetado e transmite a doença a um cão saudável.



Um **cão infetado** é um reservatório da doença, uma vez que ao ser picado por um flebótomo, este infeta-se e transmite a doença a outro cão saudável ou a uma pessoa. Por este motivo é importante continuar a reduzir o risco da picada do flebótomo, mesmo em cães infetados.




ÉPOCA DE RISCO


Nos últimos anos, devido às alterações das condições climáticas, a época de risco de transmissão da leishmaniose pelo flebótomo tem aumentado.

Por este motivo, há mais de 2 anos que a MSD Animal Health decidiu conduzir **novos estudos** de eficácia de Scalibor® mais prolongados no tempo, para investigar se os seus **elevados níveis de repelência contra o flebótomo se adaptam a estas novas condições climáticas**. Devido à variabilidade e subida das temperaturas atuais, **o risco de contágio pode existir durante todo o ano**, pelo que é muito importante proteger os cães durante os 12 meses do ano contra o flebótomo.

Já não terá de se preocupar com o início ou o fim da temporada de risco da transmissão da leishmaniose, pois a Scalibor® oferece uma proteção contra o flebótomo, durante todo o ano, com apenas uma coleira.



SINTOMAS



Principais sintomas da leishmaniose

1. Febre
2. Lesões oculares
3. Hemorragia nasal
4. Diarreia e vômito
5. Linfadenopatia
Inflamação dos gânglios linfáticos
6. Unhas anormais
Sobrecrescimento e fragilidade
7. Perda de peso e apetite
8. Intolerância ao exercício
9. Insuficiência renal
Excesso de urina e sede excessiva
10. Alterações na pele e no pelo

TRATAMENTO

O **tratamento da leishmaniose canina** é longo e complicado e apenas resolve os sintomas. Se o cão for diagnosticado e tratado a tempo, pode recuperar em grande medida a sua qualidade de vida, embora permaneça infetado e positivo à leishmaniose.

PREVENÇÃO

Proteja o seu cão durante todo o ano, contra o mosquito transmissor da leishmaniose, com apenas uma coleira.

Scalibor®

12 MESES

Esqueça-se do flebótomo transmissor da leishmaniose durante todo um ano

Outros conselhos:

- ✓ Limite os passeios noturnos na época de maior incidência.
- ✓ Utilize redes mosquiteiras de malha fina.
- ✓ Permita que o seu cão durma em casa durante a noite.
- ✓ Vacinação contra a leishmaniose.